



B0075

PREVALÊNCIA DE “PUNDING” EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON DO HC-UNICAMP E DE UMA CLÍNICA PRIVADA DE CAMPINAS SP.

Leandro Xavier de Camargo Schlittler (Bolsista FAPESP) e Profa. Dra. Elizabeth Maria Barasnevicus Quagliato (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

“*Punding*” é um sintoma compulsivo relacionado ao uso abusivo de medicamentos para o tratamento da Doença de Parkinson (DP). Ele foi relatado como um comportamento prolongado, repetitivo e sem sentido no qual o paciente pode ficar horas, ou até mesmo passar noites em claro absorto em suas atividades. Muitas vezes ele está relacionado com a profissão ou os passatempos que o paciente realizou durante a vida. Arrumações e Limpezas sem sentidos, organização e fascinação com pequenas coleções e ordenação de palavras e objetos foram alguns dos casos já descritos. Setenta e um pacientes com diagnóstico de Doença de Parkinson do Ambulatório de Transtornos do Movimento do HC-UNICAMP e de uma clínica particular de Campinas, SP foram entrevistados. A escala UPDRS e o estágio de Hoehn & Yahr foram aplicados para a avaliação da severidade da DP. Com base num questionário semi-estruturado previamente publicado na literatura pudemos determinar a presença de *punding* e sua intensidade (leve, moderado ou grave). Quatorze pacientes usavam medicação além da quantidade prescrita por seus clínicos. Desses, apenas um apresentou sintomas de *punding* severo, uma dona de casa de 51 anos cuja compulsão pela faxina da casa em períodos prolongados e horários impróprios traziam problemas familiares.

Punding - Doença de Parkinson - Neuropsiquiatria