



B0169

VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SCORE DE GRAVIDADE EM PACIENTES INTOXICADOS POR ORGANOFOSFORADOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES DA FCM-UNICAMP

Ednaldo Y. Shono (Bolsista PIBIC/CNPq), Mendonça DMD (Colaborador) e Prof. Dr. Ronan José Vieira (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

As intoxicações por organofosforados são freqüentes em nosso meio. O Centro de Controle de Intoxicações da UNICAMP (CCI) atende e auxilia o atendimento de intoxicados. Informações padronizadas sobre a gravidade contribuem para aprimorar o atendimento. O Score de Gravidade de Intoxicação (PSS)¹⁻² é baseado no quadro clínico e na evolução classificando os pacientes em 5 categorias: assintomáticos-PSS 0, leve-PSS 1, moderado-PSS 2, grave-PSS 3 e fatal-PSS 4 e foi utilizado por alguns autores na avaliação da gravidade de intoxicados.

Objetivo: Verificar a viabilidade da aplicação do PSS nos pacientes intoxicados por organofosforados atendidos pelo CCI-UNICAMP. **Método:** Coleta de dados das fichas de 224 pacientes intoxicados por organofosforados do CCI/UNICAMP de janeiro de 2003 a dezembro de 2006 e preenchimento das tabelas do PSS. **Resultados:** **PSS 0-** 75 (33,5%), **PSS 1-** 89 (39,7%), **PSS 2-** 28 (12,5%), **PSS 3-** 23(10,3%) e **PSS 4-** 9 (4%). **Conclusão:** É possível aplicar o PSS utilizando as fichas do CCI-UNICAMP. **Referências:** 1. Persson HE, Sjoberg GK, Haines JA, Pronczuk de Garbino J. Poisoning severity score. Grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 1998;36(3):205-13. 2. Bilgin TE, Camdeviren H, Yapici D, Doruk N, Altunkan AA. The comparison of the efficacy of scoring systems in organophosphate poisoning. Toxicol Ind Health 2005;21(7-8):141-6.

Organofosforados - Intoxicação - Score de gravidade