ANTAGONISTAS DE RECEPTOR ADRENÉRGICO β 1 E β 1/ β 2 BLOQUEIAM AS CONTRAÇÕES INDUZIDAS POR 6-NITRODOPAMINA NO VAS DEFERENS EPIDIDIMAL DE RATO

Palavras-Chave: Distúrbios ejaculatórios, nitrocatecolaminas, L-NAME

Autores/as:

Raquel Rios Campitelli¹, Antonio Tiago Lima¹, Amanda Consulin Amorim¹, José Britto-Júnior¹, Adriano Fregonesi¹, Fabíola Z. Mónica¹, Edson Antunes¹, Gilberto De Nucci^{1,2,3}.

1. Departamento de Farmacologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cidade Universitária, Campinas, SP 13083-887, Brasil.
2. Departamento de Farmacologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP.
3. Universidade Brasil Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Brasil, Fernandópolis, São Paulo.

INTRODUÇÃO

A 6-nitrodopamina (6-ND; figura 1) é uma nova catecolamina liberada pelo endotélio de tecidos vasculares, como os vasos do cordão umbilical humano (Britto-Jr et al. 2021a), a aorta de *Chelonoidis carbonaria* (Campos et al. 2020), e o vas deferens isolado de ratos (RIEVD; Britto-Júnior et al. 2021b, 2022). Ela foi caracterizada como o principal modulador endógeno da contratilidade do RIEVD (Britto-Jr et al. 2021b; Britto-Jr et al. 2022), e aparenta ser o principal mediador local do processo de emissão da ejaculação. O uso de antagonistas beta-adrenérgicos seletivos ou não seletivos está associado a distúrbios ejaculatórios em ratos (Srilatha et al. 1999) e em humanos (O'Meara and White 1988).

Essas observações experimentais e clínicas abrem a possibilidade de que betabloqueadores atuem como antagonistas de receptor de 6ND no vas deferens. Neste estudo, foram investigados os efeitos de antagonistas seletivos de receptor β 1- e β 1/ β 2-adrenérgico nas contrações induzidas por 6-ND, dopamina, noradrenalina, adrenalina e estimulação de campo elétrico (EFS) no RIEVD.

Figura 1: Estrutura molecular da 6ND. Fonte: <https://www.trc-canada.com/product-detail/?N493720>

METODOLOGIA

Após a eutanásia por overdose de isoflurano (agente anestésico líquido inalatório), a porção epididimal do vas deferens de ratos (figura 2) foi removida e dissecada livremente do tecido conjuntivo adjacente, sendo separada em strips de 1,5 cm cada, os quais foram imediatamente colocados em solução de Krebs-Henseleit's (KSH).

Em cubas de órgãos (imagem 3), os strips foram suspensos verticalmente por ganchos de metal na presença de 10mL de KSH e gaseificados constantemente com uma carbogênio (95%O₂: 5%CO₂) a 37°C, sendo-lhes aplicada uma tensão de repouso de 10mN, e o sistema PowerLab foi utilizado para mensurar as tensões provenientes da contração e relaxamento do tecido. Antes de iniciar, houve um tempo de estabilização do tecido de 45 minutos, e posteriormente foram realizados experimentos de curva cumulativa dose-resposta e estimulação de campo elétrico (EFS; imagem 4). Todos os protocolos experimentais realizados foram autorizados pelo Comitê de Ética em Uso Animal da UNICAMP (CEUA/UNICAMP, protocolo 5952-1/2022 e 5831-1/2021).

Figura 2 Anatomia do vas deferens de rato. Fonte: <http://card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/english/sigen/manual/cetransp.html>

Figura 3: Exemplo de tecido montado em cuba de órgãos.

Figura 4: Aparelho utilizado para estimulação de campo elétrico.

RESULTADOS

Os antagonistas seletivos de receptor β 1-adrenérgico atenolol (0.1 e 1 μ M), betaxolol (1 μ M) e metoprolol (1 μ M) e os antagonistas não seletivos de β 1/ β 2-adrenérgico propranolol (1 e 10 μ M) e pindolol (10 μ M) causaram um desvio à direita significativo da curva de contração em resposta à 6ND (pA₂ 6.41, 6.91, 6.75, 6.47 e 5.74; para atenolol, betaxolol, metoprolol, propranolol e pindolol), mas não tiveram efeito nas contrações induzidas por dopamina, noradrenalina e adrenalina.

Os efeitos dos antagonistas seletivos de receptor β 1- e β 1/ β 2-adrenérgico em maior concentração (atenolol 1 μ M, betaxolol 1 μ M, metoprolol 1 μ M, propranolol 10 μ M e pindolol 10 μ M) reduziram, também, as contrações induzidas por EFS em RIEVD, mas não o fizeram em RIEVD obtidos de animais tratados cronicamente com o L-NAME, inibidor da óxido nítrico sintase (NOS). O antagonista de receptor β 1-adrenérgico RO-363, o antagonista seletivo de receptor β 2-adrenérgico salbutamol e o antagonista seletivo de receptor β 3-adrenérgico mirabegrona, até 300 μ M, não alteraram o tônus do RIEVD.

Figura 5: Gráficos referentes à resposta do RIEVD a atenolol.

Figura 6: Gráficos referentes à resposta do RIEVD a betaxolol.

Figura 7: Gráficos referentes à resposta do RIEVD a metoprolol.

Figura 8: Gráficos referentes à resposta do RIEVD a propranolol.

Figura 9: Gráficos referentes à resposta do RIEVD a pindolol.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que os antagonistas de receptor β_1 - e β_1/β_2 -adrenérgico atuam como antagonistas de receptor de 6-ND no RIEVD, confirmando, assim, o papel principal da 6-ND na contratilidade do RIEVD.

Os autores agradecem à FAPESP e ao CAPES. RRC agradece à FAPESP pela bolsa de iniciação científica (2021/14120-4). Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

BIBLIOGRAFIA

- Britto-Júnior J, Coelho-Silva WC, Murari GF, Serpellone-Nash CE, Mónica FZ, Antunes E, De Nucci G (2021a) 6-Nitrodopamine is released by human umbilical cord vessels and modulates vascular reactivity. *Life Sci* 1(276):119425. <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2021.119425>
- Britto-Júnior J, Ximenes L, Ribeiro A, Fregonesi A, Campos R, Kiguti LRA, Mónica FZ, Antunes E, De Nucci G (2021b) 6-Nitrodopamine is an endogenous mediator of rat isolated epididymal vas deferens contractions induced by electric-field stimulation. *Eur J Pharmacol* 1(911):174544. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174544>
- Britto-Júnior J, Ribeiro A, Ximenes L, Lima AT, Jacintho FF, Fregonesi A, Mónica FZ, Antunes E, De Nucci G (2022) Alpha1- adrenergic antagonists block 6-nitrodopamine contractions on the rat isolated epididymal vas deferens. *Eur J Pharmacol* 15(915):174716. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2021.174716>
- Campos R, Pinheiro DHA, Britto-Júnior J, de Castro HA, Mendes GD, Moraes MO, Moraes MEA, Lopes-Martins RÁB, Antunes NJ, De Nucci G (2020) Quantification of 6-nitrodopamine in KrebsHenseleit's solution by LC-MS/MS for the assessment of its basal release from *Chelonoidis carbonaria* aortae in vitro. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci* 22(1173):122668. <https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2021.122668>

O'Meara J, White WB (1988) Ejaculatory failure and urinary dysfunction secondary to labetalol. *J Urol* 139(2):371–2. [https://doi.org/ 10.1016/s0022-5347\(17\)42420-7](https://doi.org/10.1016/s0022-5347(17)42420-7)Srilatha B, Adaikan PG, Arulkumaran S, Ng SC (1999) Sexual dysfunction related to antihypertensive agents: results from the animal model. *Int J Impot Res* 11(2):107–113. <https://doi.org/10.1038/sj.ijir.3900393>