



B0082

ESTUDO COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES COM ELT E EET

Henrique Balloni (Bolsista CNPq), Simone Appenzeller e Prof. Dr. Fernando Cendes (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas – FCM, UNICAMP

O objetivo foi comparar as manifestações clínicas de pacientes com epilepsia do lobo temporal (ELT) e extratemporais (EET). Foram revisados os prontuários de 124 pacientes (88 com ELT e 36 com EET), com média de idade ao início das crises de 12,8 anos (desvio padrão (DP)=9,8) para os pacientes com ELT e de 9 anos (DP=6,9) dos com EET ($p=0.03$). Antecedente de convulsão febril foi observado em 48 (55%) no grupo com ELT e em 7 (19,4%) nos pacientes com EET ($p=0.021$). Eventos peri-natais foram mais frequentemente observados em pacientes com EET ($p=0.029$). Remissão foi observada em 52 (59%) pacientes com ELT e em 27 (75%) dos pacientes com EET (0.035). Conclusão: observamos que pacientes com EET apresentam início das crises mais precocemente, antecedentes de eventos peri-natais. Estas diferenças podem ser devidos a presença de epilepsia refratárias.

Epilepsia - Epidemiologia - Evolução