

RODRIGUES, T.O.\*; POSSOBON, R. F.

Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais - Cepae  
 Depto. de Odontologia Social - Área de Psicologia Aplicada  
 Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp  
 Agência Financiadora: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC/CNPq  
 Palavras-chave: Aleitamento materno - Alimentação infantil - Chupeta - Mamadeira - Hábitos orais.



## Introdução

A amamentação natural é fundamental para a promoção e a proteção da saúde da díade mãe-lactente. Além disso, a amamentação supre a necessidade de sucção do bebê, o que evita a utilização de chupeta e a sucção de dedo, os quais podem levar ao desenvolvimento de quadros de maloclusão. Apesar destas vantagens, os índices de aleitamento ainda estão aquém do preconizado pela OMS (100% das crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade).

## Objetivo

Investigar os índices de uso de chupeta e mamadeira e a taxa de aleitamento materno entre mães participantes de um programa preventivo precoce em saúde bucal.

## Metodologia


Todas as díades mãe-criança, com faixa etária entre 0 e 6 meses, que passaram pelo programa Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (GIAME) do Cepae-Fop-Unicamp, no ano de 2009, e que apresentaram todos os prontuários completos, foram incluídas na pesquisa. Foram excluídas da amostra: mães de gemelares; crianças com deficiências ou síndromicas; crianças nascidas pré-termo (antes de 37 semanas de gestação) ou com baixo-peso (menos de 2500 g). Os dados foram coletados dos prontuários das crianças.

## Conclusões


O hábito mais frequente entre as crianças da amostra foi o uso da mamadeira, associada ou não ao uso da chupeta. Em relação ao índice de aleitamento materno, 84,6% das crianças ainda recebiam leite materno aos seis meses de idade, sendo que 29,5% de forma exclusiva.

## Resultados

Das 78 díades da amostra, apenas 45 crianças possuíam algum tipo de hábito deletério bucal.



**Figura 1:** Distribuição da amostra segundo os hábitos de chupeta e/ou mamadeira (N=45).



**Figura 2:** Distribuição da amostra segundo o tipo de aleitamento materno (AME: exclusivo; AMC: complementado) e o desmame (D), de acordo com a idade em meses.