



P1296

**RELAÇÃO ENTRE A INTENÇÃO E A ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO E A UTILIZAÇÃO DE CHUPETA E MAMADEIRA ENTRE GESTANTES E LACTANTES**

Bianca Cristina Forti (Bolsista PICJr/CNPq), Ludmila da Silva Tavares Costa, Paloma Cristofoleti e Profa. Dra. Rosana de Fatima Possobon (Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

O Programa de Orientação a Gestante (POG) e o Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (GIAME) (Cepae–FOP–Unicamp) disponibilizam aconselhamento a gestantes/lactantes a fim de contribuir para elevar índices de aleitamento materno e diminuir o uso de chupeta e mamadeira. Esse estudo investigou a intenção e a decisão de mães em relação às práticas de aleitamento materno e o uso de chupeta e mamadeira. A amostra foi constituída por 141 mães escolhidas aleatoriamente e que participaram do POG e GIAME desde 2005. Os dados foram coletados antes e após palestras do POG e no último encontro do GIAME. Os resultados mostraram que, embora as gestantes aceitem mais a informação de não utilizar chupeta (84,2%) do que de não utilizar mamadeira (77,1%), o índice de uso de chupeta ao 6º mês de vida da criança é maior (43,3%) do que o índice de utilização da mamadeira (41,8%). Houve uma relação positiva entre intenção de amamentar por mais de seis meses e índice de aleitamento materno exclusivo ao sexto mês. O índice de desmame precoce (10,6%) e de utilização de chupeta e mamadeira ficou aquém dos índices relatados por outros autores.

Hábito oral - Aleitamento materno - Sucção