



B0165

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: ETIOLOGIAS MAIS FREQUENTES

Raquel Andrade Lauria (Bolsista PIBIC/CNPq), Maria de Fátima Correa Pimenta Servidoni e Prof. Dr. Gabriel Hessel (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Hemorragia Digestiva Alta (HDA) consiste em qualquer sangramento de origem gastrointestinal em localização acima do ângulo de Treitz. Apesar de causa comum de hospitalização e atendimento de emergência na faixa etária pediátrica, os dados sobre a epidemiologia da HDA na literatura são insuficientes. O objetivo desse trabalho foi identificar as etiologias mais frequentes e manifestações clínicas da HDA em crianças e adolescentes atendidos em um hospital terciário de referência. Para atingir esses objetivos, está em curso um estudo descritivo retrospectivo, no qual serão analisados prontuários de todos os pacientes que procuraram o serviço de Gastropediatria e/ou o Pronto Socorro de Pediatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP por queixa de HDA durante o período de janeiro de 1991 a agosto de 2010. A coleta dos dados é realizada a partir de um protocolo contendo a identificação do paciente, seu quadro clínico, o diagnóstico anatômico e etiológico da HDA. Até o momento, foram incluídos no estudo 100 pacientes, com 124 episódios de HDA, entre o período de janeiro de 1991 até dezembro de 2003. Os resultados parciais mostram que a hematemese é a principal forma de apresentação da HDA e as etiologias mais frequentes são a gastrite (26,61%), as varizes esofágicas (25,81%) e a esofagite (20,16%).

Hemorragia digestiva alta - Etiologia - Pediatria