



B0205

### **AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO DECORRER DO TRATAMENTO DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE**

Rodrigo Costa Bonardi (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Manoel Barros Bertolo (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente o esqueleto axial, mas pode afetar as articulações periféricas e apresentar caráter sistêmico, sendo sua etiologia desconhecida. O presente estudo tem como finalidade avaliar pacientes diagnosticados com EA e verificar os scores dos índices de atividade e funcionalidade: BASDAI e BASFI; qualidade de vida: SF-36 e depressão: Escala de depressão de Beck no decorrer do tratamento, fazendo uma comparação entre a atividade da doença, a qualidade de vida do paciente e depressão. Os pacientes foram submetidos a exame físico completo em todas as visitas foi solicitado para que respondessem os questionários. Os resultados obtidos sugerem que grande parte dos pacientes apresenta depressão de leve a moderada (média da Escala de depressão de Beck foi 11,6 – máximo 63 pontos), de leve a moderada atividade da doença (BASDAI apresentou média de 28,3 pontos – máximo 60 pontos), moderada funcionalidade (BASFI apresentou score médio de 43,9 - máximo 100), e o SF-36 apresentou pontuação média de 94,27.

Espondilite anquilosante - Tratamento - Qualidade de vida