



B0307

### **ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DA SÍNDROME DA BEXIGA HIPERATIVA EM MULHERES JOVENS NA CIDADE DE CAMPINAS**

Marina Raimondi (Bolsista PIBIC/CNPq), Maria Fernanda Brancalion, Ms. Ft. Maria Celina Fozzatti (co-orientadora) e Prof. Dr. Cássio Luís Zanettini Riccetto (Orientador), Hospital das Clínicas - HC, UNICAMP

Bexiga Hiperativa é definida como urgência urinária, podendo estar associada a outras manifestações clínicas. Devido a essa condição, muitas mulheres jovens têm comprometimento na sua qualidade de vida, causando limitações e desconforto. Por ter sido definida recentemente, foram realizados poucos estudos indicando sua prevalência e os impactos dela na sociedade. O objetivo do projeto é identificar a prevalência dos sintomas de BH em mulheres no menacme na população de Campinas, SP. Para isso será realizado um estudo epidemiológico, com base no questionário International Consultation on Incontinence Questionnaire – Overactive Bladder (ICIQ-OAB) aplicado em mulheres na faixa etária de 20 a 45 anos. A determinação do tamanho da amostra foi realizada com assessoria do Setor de Estatística da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp a partir de um estudo piloto que envolveu 108 mulheres e, a partir de análise baseada na média do Escore OAB, foi obtido o n de 1055 mulheres. O resultado parcial obtido com 199 entrevistas foi uma média de 2,93 de escore do questionário de OAB, com desvio padrão de 3,65. Devido ao tamanho amostral calculado, foi solicitada prorrogação da bolsa visando sua conclusão, possibilitando a obtenção do n previsto para a correta análise dos resultados.

Bexiga hiperativa - Urgência urinária - Prevalencia