



B0114

ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO COMPARATIVO DOS CASOS DE DENGUE EM SUMARÉ NOS ANOS 1997, 2002-2003, 2005 E 2006-2007

Vinicius Citelli Ribeiro (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Francisco Hideo Aoki (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Objetivos: Evidenciar as alterações clínicas mais relevantes que norteiam o diagnóstico da dengue, observando sua prevalência nos casos da cidade de Sumaré e determinar as regiões de maior incidência nas epidemias entre os anos de 1997-2007. Metodologia: Será realizado um estudo individuado, observacional e longitudinal do tipo coorte retrospectivo com dados de fichas de notificação compulsória de pacientes positivos para DENGUE em Sumaré nos anos 1997, 2002-2003, 2005 e 2006-2007. Resultados e Conclusões: Análise parcial (3045 de aproximadamente 5000 casos). Quanto ao ano de ocorrência dos casos: 1997 (1,8%), 2002 (8,2%), 2003 (3,7%), 2005 (1,3%), 2006 (11%) e 2007 (preenchimento parcial) (74%). Quanto a prevalência dos sintomas: febre (97%), cefaléia (92,8%), mialgia (86%), prostração (84,1%), dor retro-orbitária (76,3%), náusea e vômitos (67,6%), artralgia (66,5%), exantema (40,8%) e diarreia (34,9%). Sete sintomas apresentam prevalência maior que 50%. Manifestações hemorrágicas apareceram em 11,9% dos casos. Registraram-se casos de 154 bairros de Sumaré. Os mais incidentes são: Jd. Nova Terra (8,1%), Jd. São Judas I e II (7,6%), Jd. Bom Retiro (7,5%), Pq. Das Nações (5,4%), Bandeirantes (5%) e Jd. Denadai (4,5%). Apenas seis bairros somam 38,1% dos casos.

Dengue - Epidemiologia - Epidemia