



B0110

RESULTADOS DAS GESTAÇÕES GEMELARES MONOCORIÔNICAS DIAMNIÓTICAS COM SÍNDROME DE TRANSFUSÃO FETO-FETAL GRAVE SUBMETIDAS À ABLAÇÃO DE VASOS PLACENTÁRIOS COM LASER

Luciana Emy Ishikawa (Bolsista SAE/UNICAMP), Ricardo Barini e Prof. Dr. Cleisson Fabio Andrioli Peralta (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A Síndrome da transfusão feto-fetal (STFF) ocorre em 10 - 30% das gestações gemelares monocoriônicas diamnióticas e pode ter prognóstico perinatal ruim. O objetivo deste estudo é avaliar retrospectivamente a evolução das gestações monocoriônicas diamnióticas com STFF grave que foram submetidas à oclusão dos vasos placentários com o uso do laser no CAISM – UNICAMP de 2007 a 2009. Será realizada uma análise descritiva desses casos, com avaliação da idade gestacional e do grau da STFF por ocasião do tratamento intra-útero, das complicações imediatas e tardias do procedimento e dos resultados neonatais.

Gestação gemelar - Transfusão feto-fetal - Laser vasos placentários