



B0126

**FATORES ASSOCIADOS AO BAIXO PESO AO NASCIMENTO ENTRE ADOLESCENTES DO CAISM/UNICAMP**

Maria Beatriz Bracco Suarez (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Fernanda Garanhani de Castro Surita (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O objetivo do estudo foi conhecer a frequência do baixo peso ao nascimento (BPN) entre adolescentes e identificar outros fatores associados ao BPN nesta população. Foram coletados dados informatizados do Serviço de Obstetrícia do CAISM. No período de outubro/1994 à 15/dezembro/2009 ocorreram 24000 partos. Destes, 2404 foram em 2357 adolescentes (10,02%). A idade média foi 17,4 anos. As médias da idade da menarca e início da atividade sexual foram, respectivamente, 12,1 e 14,5. Houve recorrência de gravidez em 47 meninas. O parto foi vaginal em 69,4% dos casos e 27 gestações foram gemelares. A frequência de BPN foi de 15,1%. Dicotomizamos o grupo em adolescentes com e sem BPN (349 com BPN x 2041 sem BPN) e apenas o antecedente de aborto e de lúpus eritematoso sistêmico aumentou o risco de BPN. Fatores como idade menor que 15 anos, tabagismo e pré-eclâmpsia, não foram significativos para aumentar o risco de BPN nesta população. As adolescentes com BPN apresentaram maiores taxas de cesarianas e Apgar menor que 7 no 1º e 5º minutos de vida. Concluiu-se que a frequência de BPN na nossa população foi maior do que o esperado para a população geral e para a população de adolescentes (cerca de 10%) e que outros fatores relacionados ao BPN tiveram pouco impacto sobre esse resultado

Peso baixo ao nascimento - Gravidez - Adolescência