



Características epidemiológicas de pacientes atendidos por hemodiálise em hospital de referência no período de 2000-2010.



rbertato@hotmail.com



Bertato, R.*; Queluz, D.P.

Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP

Palavras-chave: hemodiálise – epidemiológico - demográficos

INTRODUÇÃO

É conhecido atualmente que cerca de um em cada 10 adultos são portador de doença renal crônica. Apesar do tratamento, a maioria dos pacientes progride para estágios mais avançados da doença, quando se faz necessária a instalação de terapias substitutivas dos rins, na forma de diálise ou transplante renal.

OBJETIVO

O objetivo desse estudo é caracterizar epidemiologicamente os pacientes atendidos por hemodiálise em hospital de referência no período de 2000-2010.

MATERIAL E MÉTODOS

➤ A amostra selecionada é a do setor de nefrologia de um hospital público de referência da cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo.


➤ Através da coleta de dados dos prontuários e fichas de registro clínico hospitalar dos pacientes no período de 2000-2010, sendo que os dados foram coletados no quarto trimestre de 2011 e no primeiro trimestre de 2012.

➤ O presente estudo teve seu início após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP (protocolo 155/2011)

➤ Foram levantados os seguintes dados: faixa etária, gênero, raça, escolaridade, estado civil, profissão, cidade de residência, convênio, causa da doença renal.

RESULTADOS

Foram analisados 388 prontuários de pacientes atendidos por hemodiálise de um hospital da cidade de Piracicaba – SP. A maioria dos pacientes se encontra: na faixa etária de 51 a 70 anos (n= 179, 46,13% com \bar{X} = 55,77), gênero masculino (n= 230, 59,28%), raça branca (n=139, 35,82%), escolaridade com 1º grau incompleto (n=140, 36,08%), estado civil de casado (n= 152, 39,18%), profissão aposentado e do lar (n=127, 32,73%), residentes em Piracicaba (n=217, 55,93%), atendidos pelo Sistema Único de Saúde (n= 352, 90,72%). A principal causa da doença renal foi a hipertensão (n=76, 19,59%), seguida pela diabetes (n=67, 17,27%).



CONCLUSÃO

Com os dados obtidos nesta pesquisa, foi possível caracterizar os pacientes atendidos por hemodiálise em hospital de referência no período de 2000-2010. Atributos como a baixa escolaridade e a falta de uma profissão remunerada podem influenciar em uma procura por atendimento médico, tornando mais difícil um possível caminho para um diagnóstico precoce, que poderia interferir diretamente na necessidade de um tratamento de hemodiálise.