



B0132

METÁSTASES LINFÁTICAS EM CÂNCER DE LARINGE: ESTUDO RETROSPECTIVO DA TAXA DE METÁSTASES LINFÁTICAS EM ESVAZIAMENTO CERVICAL

Marcelo de Arruda Faber (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Carlos Takahiro Chone (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Resumo: A via linfática é a forma preferencial de disseminação do carcinoma espinocelular (CEC) da laringe. Existe um embate quanto a melhor forma de ressecção dos linfonodos com metástases ocultas num pescoço clinicamente negativo. A ausência de uma metodologia capaz de determinar qual paciente apresenta metástase linfática ou não, no paciente com pescoço clinicamente negativo, ainda não permite que o esvaziamento cervical eletivo (ELET) não seja realizado quando há alto risco de metástase linfática. Porém, muitas das peças cirúrgicas, até 80%, serão histologicamente negativas. A realização da cirurgia cervical além da ressecção do tumor primário acarreta maior morbidade cirúrgica ao paciente. **Objetivo e Métodos:** Levantar a taxa de metástases linfáticas encontradas em ELET após cirurgias de laringectomia realizadas no Hospital das Clínicas da UNICAMP através de um estudo retrospectivo com prontuários de pacientes com CEC de laringe, submetidos a ELET pós laringectomia no período de 1988 a 2005. **Resultados:** Até o momento foram levantados 20% do N proposto, sendo avaliada negatividade histológica em 87,5% das peças. **Conclusões:** Os números atuais ainda não são conclusivos.

Metástases linfáticas - Esvaziamento cervical - Carcinoma espinocelular