



B0312

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES ATENDIDOS POR HEMODIÁLISE EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO PERÍODO DE 2000-2010: UM ALERTA PARA A NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO PRECOCE

Renata Bertato (Bolsista SAE/UNICAMP) e Profa. Dra. Dagmar de Paula Queluz (Orientadora), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

É conhecido atualmente que cerca de um em cada 10 adultos é portador de doença renal crônica. Apesar do tratamento, a maioria dos pacientes progride para estágios mais avançados da doença, quando se faz necessária a instalação de terapias substitutivas dos rins, na forma de diálise ou transplante renal. O objetivo desse estudo é caracterizar epidemiologicamente os pacientes atendidos por hemodiálise em hospital público de referência no período de 2000-2010. Através da coleta de dados dos prontuários e fichas de registro clínico hospitalar dos pacientes no período de 2000-2010 foram analisados 388 prontuários de pacientes atendidos por hemodiálise de um hospital da cidade de Piracicaba – SP. A maioria dos pacientes se encontra: na faixa etária de 51 a 70 anos ($n= 179$, 46,13% com $\bar{X}= 55,77$), gênero masculino ($n= 230$, 59,28%), raça branca ($n=139$, 35,82%), escolaridade com 1º grau incompleto ($n=140$, 36,08%), estado civil de casado ($n= 152$, 39,18%), sem profissão remunerada ($n=127$, 32,73%), residentes em Piracicaba ($n=217$, 55,93%), atendidos pelo Sistema Único de Saúde ($n= 352$, 90,72%). A principal causa da doença renal foi a hipertensão ($n=76$, 19,59%), seguida pela diabetes ($n=67$, 17,27%). Atributos como a baixa escolaridade e a falta de uma profissão remunerada podem influenciar em uma procura por atendimento médico, tornando mais difícil um possível caminho para um diagnóstico precoce, que poderia interferir diretamente na necessidade de um tratamento de hemodiálise.

Hemodiálise - Epidemiológico - Demográfico