



B0152

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO SEXUAL PRÉ E PÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL NOS PACIENTES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, HC-UNICAMP, DE 1995 ATÉ 2010

Marcelo Vezzi Muce (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Fábio Hüsemann Menezes (Orientador),
Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

Em pacientes submetidos à correção cirúrgica do aneurisma de aorta abdominal, duas das possíveis consequências são a disfunção erétil (DE) e a ejaculação retrógrada (ER). O objetivo do presente estudo é conhecer a função sexual de homens submetidos à correção cirúrgica, na UNICAMP. Através de um questionário padronizado enviado aos pacientes e um banco de dados, com informações referentes à função sexual, obtido nas consultas de retorno de controle pós-operatório, objetivamos estabelecer a correlação entre a DE e a ER e o tipo de cirurgia realizado. Foram enviadas 130 cartas, porém apenas 15 foram respondidas de maneira correta. No nosso banco de dados, temos 175 pacientes, 26 foram excluídos por falecerem precocemente e entre os demais se obteve informações sobre a função sexual em 102 (67%). A idade média foi de 66,4 anos e o tempo médio de seguimento foi de 6 anos e 3 meses. 21% dos pacientes relataram não ter atividade sexual (falta de companhia, idade avançada), 36% relataram manutenção normal da função sexual, 18% disfunção erétil e 24% ejaculação retrógrada com ereção preservada. A DE prevaleceu em pacientes onde as ilíacas internas não foram preservadas (50%) e a ER nos submetidos a próteses aorto-aórticas (44%). A função sexual normal esteve mais associada às derivações aorto-ilíacas (42%).

Aneurisma de aorta abdominal - Disfunção erétil - Ejaculação retrógrada