



B0253

IMPACTO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA ADESÃO AO TRATAMENTO HORMONIOTERÁPICO DE MULHERES COM NEOPLASIA DE MAMA

Jacqueline Marques dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), Aline Cruz, Valéria de Souza Santos Holsback, Nice Maria de Oliveira Silva, Roberta Paro de Carvalho e Profa. Dra. Priscila Gava Mazzola (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O tamoxifeno é o hormonioterápico de escolha para o tratamento de câncer de mama em pacientes com tumor com expressão de receptores hormonais, com duração padrão de 5 anos, sendo que é de fundamental importância que as pacientes tenham adequada adesão ao tratamento. Os objetivos do estudo foram avaliar o impacto da Atenção Farmacêutica (método de Minnesota) sobre a adesão ao tratamento com o hormonioterápico tamoxifeno e a diminuição da ocorrência de PFT's (problemas farmacoterapêuticos) ao longo de 8 meses. O estudo foi realizado no Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti, UNICAMP. Para avaliação da adesão foi utilizado o Teste de Morisky-Green. Foram incluídas no estudo 50 pacientes, com média de idade de $55,0 \pm 11,0$ anos. Foram identificados 101 PFT's ($2,02 \pm 1,13$ PFTs por paciente) no primeiro atendimento. Em relação à primeira medida de adesão, 34,0% (n=17) das pacientes foram consideradas como tendo alta adesão e 66,0% (n=33), como média adesão. Até o momento, 13 pacientes chegaram ao final do período de acompanhamento, sendo 76,92% (n=10) consideradas com alta adesão e 23,08% (n=3) com média adesão. A Atenção Farmacêutica tem contribuído efetivamente para a melhoria da adesão ao tamoxifeno em pacientes com câncer de mama.

Atenção farmacêutica - Neoplasia de mama - Problemas farmacoterapêuticos