



B0198

ANÁLISE DAS DIFERENTES MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS AO DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SÍNDROME DE CUSHING

Luciana Carvalho Delamuta (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. Lília Freire Rodrigues de Souza Li (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A Síndrome de Cushing (SC) caracteriza-se por excessiva exposição à glucocorticoides, por fontes exógenas ou endógenas, resultantes principalmente do excesso de ACTH. Além das manifestações clínicas clássicas, podem aparecer manifestações atípicas (MA). Objetivo: Investigar as variabilidades das manifestações atípicas no momento do diagnóstico, determinar sua incidência em uma determinada população, bem como comparar dados clínicos entre os pacientes com e sem MA. Resultados: Dos 51 pacientes com SC, 10 apresentaram SC secundária à excessiva exposição à glucocorticoides. Os sintomas típicos que apresentaram maior frequência foram: obesidade, ganho de peso, hipertensão, fraqueza muscular e face de lua cheia. Quatorze pacientes apresentaram MA, incluindo: hipermenorreia, vasculite livedoide, constipação, palpitações, ICC, intolerância ao calor, anasarca, sonolência excessiva, cefaleia, dor lombar, dores articulares, apneia, dispneia, calafrios, fenômeno de Raynaud, diminuição do volume urinário e lesões eritematosas em membros superiores. Houve associação de MA com a presença de fácies de lua cheia e com sintomas típicos menos frequentes em SC. Não foram identificados pacientes com MA isoladamente, sugerindo subdiagnóstico de SC nesta população.

Pubarca - Obesidade - Manifestações atípicas